

Yayın Adı Akdeniz Güncel
Referans No 20358623
Renk Rensiz

Yayın Tarihi 22.12.2012
Etki Tarafsız
STxCM 90,00

Küpür Sayfa 1
Tiraj 1000
Sayfa 6

Çocuğunuz ağladığı için fitık olmaz!

Kasık fitıkları özellikle yenidoğan döneminde çok daha fazla görülüyor.

Özellikle erkek çocuklarda daha fazla görülen ve ağladığı için ortaya çıktığına dair yanlış bir kanının olduğu kasık fitıklarını Hisar Intercontinental Hospital Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Salih Somuncu ile konuştuk...

Kasık fitıklarının özellikle yenidoğan döneminde çok daha fazla görüldüğünü, bu nedenle ailelerin çok dikkatli olmaları gerektiğini belirten Doç. Dr. Salih Somuncu; Bebek anne karnındayken çocuğun testisi kendi karnındadır. Doğumuna

yaklaşan dönemde 7. aydan itibaren kanala, oradan da torbaya iner. Bu iniş karın zarı da eşlik eder. Iniş tamamlandıktan sonra torbaya inen kanal kapanır. Kapanan o zar tabakasının yanından, aı kasından, sperm kanalı, testisin

atardamarı, toplardamarı ve sinir yapıları geçer. Eğer bu zar tabakası yetersiz kapanırsa karın içi organlar kanala doğru ilerler.


Çocuklarda görülen bu kasık fitığına indirekt kasık fitığı adı verilir. Özellikle prematüre, düşük doğum ağırlıklı, ailesinde fitik problemi, bağ doku hastalığı olanlarda ve inmemiş testis problemi yaşayan çocuklarda daha sık görülür. Doğumsal bir hastalıktır ve eninde sonunda ortaya çıkar. En temel belirti kasıkta görülen şişliktir. Bu şişlik kabızlık, ağlama gibi karın içi basıncını artıran durumlarda ortaya çıkar. Bu nedenle aileler çocuklarının ağlama nedeniyle fitik olduğuna dair yanlış bir kaniya kapılabilirler. Aksine çocuklar ağladıkları için fitik olmazlar; fitik oldukları için ağlarlar.' diye konuştu...

Kasık Fitıklarını Aynı Bölge Hastalıklarından Ayırt Edebilmeniz İçin...

Erkeklerde kasık fitıklarının dışında inmemiş testis,

hidrosel ve kordon kisti de görülebilir. Eğer karın zarı tabakası, kanalın üstünde ve altında kapanır; ortası açık kalırsa kordon kisti adı verilen hastalık ortaya çıkar. Tedavisi kasık fitıklarının tedavisi gibidir. Tanı konulduktan sonra bir süre beklenir; gerilemezse cerrahi müdahale yapılır.

Halk arasında su fitığı olarak bilinen ve en çok yenidoğanlarda ilk 6 ayda görülen hidroselde ise; zar tabakası kanal boyunca kapalıdır. Ama torbada testisin etrafı açıktır ve içi sıvı dolar. Genelde 1 yaşına kadar kontrol altında tutularak beklenir; çocuk 1 yaşını geçtikten sonra düzelmezse ameliyat edilir.



Kasık Fitıkları Acele Cerrahi Müdahale Gerektirir ve İyi Bir Teknikle Onarılan Fitik Tekrarlamaz!

Fitik acele cerrahi gerektiren bir problemdir. Kendiliğinden iyileşmesi söz konusu değildir. Ameliyat; doktorun, hastanın ve ailenin hazır olduğu en kısa zamanda yapılmalıdır. Eğer ameliyat edilmez ise kısa vadede en korkulan komplikasyon fitığın boğulmasıdır.

Boğulan bu organlar fitik kesesinin içerisine ilerleyen bağırsak ve karın içi organlar olabileceği gibi; kızlarda çoğu zaman yumurtalık da olabilir. Bu nedenle erken müdahale çok önemlidir. Erkek çocuklarda uzun vadede fitik, testis ve damarlarına zarar vererek hücresel anlamda bozulmalara neden olur. Bu yüzden tanı konulduktan sonra en kısa sürede ameliyat gerekir. Genel anestezi altında yapılan operasyonun ardından hasta aynı gün taburcu edilir; ertesi gün ve 1 hafta sonra kontrole çağırılır.