


Yayın Adı Tribün Gazetesi  
Referans No 20437115  
Renk Renkli

Yayın Tarihi 24.12.2012  
Etki Tarafsız  
STxCM 94,00

Küpür Sayfa 1  
Tiraj 1000  
Sayfa 8



## Çocuğunuz ağladığı için fitik olmaz!

Özellikle erkek çocuklarda daha fazla görülen ve ağladığı için ortaya çıktığına dair yanlış bir kanının olduğu kasık fitiklarını Hisar Intercontinental Hospital Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Salih Somuncu ile bilgiler verdi.

Kasık fitiklarının özellikle yenidoğan döneminde çok daha fazla görüldüğünü, bu nedenle ailelerin çok dikkatli olmaları gerektiğini belirten Doç. Dr. Salih Somuncu; Bebek anne karnındayken çocuğun testişi kendi karnındadır. Doğumuna yaklaşan dönemde 7. aydan itibaren kanala, oradan da torbaya iner. Bu iniş karın zarı da eşlik eder. İnş tamamlandıktan sonra torbaya inen kanal kapanır. Kapanan o zar tabakasının yanından arkasından, sperm kanalı, testisin atardamarı, toplardamarı ve sinir yapıları geçer. Eğer bu zar tabakası yetersiz kapanırsa karın içi organlar kanala doğru ilerler. Çocuklarda görülen bu kasık fitığına indirekt kasık fitığı adı verilir. Özellikle prematüre, düşük doğum ağırlıklı, ailesinde fitik problemi, bağ doku hastalığı olanlarda ve inmemiş testis problemi yaşayan çocuklarda daha sık görülür. Doğumsal bir hastalıktır ve eninde sonunda ortaya çıkar. En temel belirti kasıkta görülen şişliktir. Bu şişlik kabızlık, ağlama gibi karın içi basıncını artıran durumlarda ortaya çıkar. Bu nedenle aileler çocuklarının ağlama nedeniyle fitik olduğuna dair yanlış bir kaniya kapılabirler. Aksine çocuklar ağladıkları için fitik olmazlar; fitik oldukları için

ağlıyorlar.' diye konuştu...

### **Kasık Fitiklarını Aynı Bölge Hastalıklarından Ayırt Edebilmeniz İçin...**

Erkeklerde kasık fitiklarının dışında inmemiş testis, hidrosel ve kordon kisti de görülebilir. Eğer karın zarı tabakası, kanalın üstünde ve altında kapanır; ortası açık kalırsa kordon kisti adı verilen hastalık ortaya çıkar. Tedavisi kasık fitiklarının tedavisi gibidir. Tanı konulduktan sonra bir süre beklenir; gerilemezse cerrahi müdahale yapılır.

Halk arasında su fitiği olarak bilinen ve en çok yenidoğanlarda ilk 6 ayda görülen hidroselde ise; zar tabakası kanal boyunca kapalıdır. Ama torbada testisin etrafı açıktır ve içi sıvı dolar. Genelde 1 yaşına kadar kontrol altında tutularak beklenir; çocuk 1 yaşını geçtikten sonra düzelse ameliyat edilir.

### **Ameliyattan sonra dikkat edilmesi gerekenler...**

- Ameliyat bölgesi herhangi bir travmaya maruz kalmamalıdır.
- Fitik torbaya kadar inmişse torba şişebilir, kızarabilir, hafif morarabilir. Bu ameliyattın normal sürecidir. Endişelenmeyin.

### **Bu Belirtiler Varsa Hekime Hemen Başvurun!**

- Ameliyat sonrası o bölgede anormal şişlik kızarıklık olursa,
- Çocukta karın şişliği görülürse,
- Büyük abdest yapamama gibi barsak sendromları ortaya çıkarsa hiç vakit kaybetmeden hekime başvurulmalıdır.

Haber Merkezi