



**Yayın Adı** 24 Saat Gazetesi  
**Referans No** 20377224  
**Renk** Renksiz

**Yayın Tarihi** 24.12.2012  
**Etki** Tarafsız  
**STxCM** 220,00

**Küpür Sayfa** 1  
**Tiraj** 1250  
**Sayfa** 14

# Çocuğunuz ağladığı için fitik olmaz, fitik olduğu için ağlar

Özellikle erkek çocuklarda daha fazla görülen ve ağladığı için ortaya çıktığına dair yanlış bir kanının olduğu kasık fitiklerini **Hisar Intercontinental Hospital Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Salih Somuncu ile konuştuk.**

Kasık fitiklerinin özellikle yenidoğan döneminde çok daha fazla görüldüğünü, bu nedenle ailelerin çok dikkatli olmaları gerektiğini belirten Doç. Dr. Salih Somuncu; Bebek anne karından geçen çocuğun testisi kendi karnındadır. Doğumuna yaklaşan dönemde 7. aydan itibaren kanala, oradan da torbaya iner. Bu inişe karın zarı da eşlik eder. İnış tamamlandıktan sonra torbaya inen kanal kapanır. Kapanan o zar tabakasının yanından arkasından, sperm kanalı, testisin atardamarı, toplardamarı ve sinir yapıları geçer. Eğer bu zar tabakası yetersiz kapanırsa karın içi organlar kanala doğru ilerler. Çocuklarda görülen bu kasık fitiğine indirekt kasık fitiği adı verilir. Özellikle prematüre, düşük doğum ağırlıklı, ailesinde fitik problemi, bağ doku hastalığı olanlarda ve inmemiş testis problemi yaşayan çocuklarda daha sık görülür. Doğumsal bir hastalıktır ve eninde sonunda ortaya çıkar. En temel belirti kasıkta görülen şişliktir. Bu şişlik kabızlık, ağlama gibi karın içi basıncını artıran durumlarda ortaya çıkar. Bu nedenle aileler çocuklarının ağlama nedeniyle fitik olduğuna dair yanlış bir kaniye kapılabilirler. Aksine çocuklar ağladıkları için fitik olmazlar; fitik oldukları için ağlarlar.' diye konuştu...

Kasık Fitiklerini Aynı Bölge Hastalıklarından Ayırt Edebilmeniz İçin...  
Erkeklerde kasık fitiklerinin dışında inmemiş testis, hidrosel ve kordon kisti de görülebilir. Eğer karın zarı tabakası, kanalın üstünde ve altında kapanır; ortası açık kalırsa kordon kisti adı verilen hastalık ortaya çıkar. Tedavisi kasık fitiklerinin tedavisi gibidir. Tanı konulduktan sonra bir süre beklenir; gerilemezse cerrahi müdahale yapılır.

Halk arasında su fitiği olarak bilinen ve en çok yenidoğanlarda ilk 6 ayda görülen hidroselde ise; zar tabakası kanal boyunca kapalıdır. Ama torbada testisin etrafı açıktır ve içi sıvı dolar. Genelde 1 yaşına kadar kontrol altında tutularak beklenir; çocuk 1 yaşını geçtikten sonra düzelmezse ameliyat edilir.

Kasık Fitikleri Acele Cerrahi Müdahale Gerektirir ve İyi Bir Teknikle Onarılan Fitik Tekrarlamaz!

Fitik acele cerrahi gerektiren bir problemdir. Kendiliğinden iyileşmesi söz konusu değildir. Ameliyat; doktorun, hastanın ve ailenin hazır olduğu en kısa zamanda yapılmalıdır. Eğer ameliyat edilmez ise kısa vadede en korkulan komplikasyon fitiğin boğulmasıdır.



Boğulan bu organlar fitik kesesinin içerisine ilerleyen bağırsak ve karın içi organlar olabileceği gibi; kızlarda çoğu zaman yumurtalık da olabilir. Bu nedenle erken müdahale çok önemlidir. Erkek çocuklarda uzun vadede fitik, testis ve damarlarına zarar vererek hücresel anlamda bozulmalara neden olur. Bu yüzden tanı konulduktan sonra en kısa sürede ameliyat gerekir. Genel anestezi altında yapılan operasyonun ardından hasta aynı gün taburcu edilir; ertesi gün ve 1 hafta sonra kontrole

çağırılır.

Ameliyattan sonra dikkat edilmesi gerekenler...

- Ameliyat bölgesi herhangi bir travmaya maruz kalmamalıdır.
- Fitik torbaya kadar inmişse torba şişebilir, kızarabilir, hafif morarabilir. Bu ameliyatın normal sürecidir. Endişelenmeyin.

Bu Belirtiler Varsa Hekime Hemen Başvurun!

- Ameliyat sonrası o bölgede anormal

şişlik kızarıklık olursa,

- Çocukta karın şişliği görülürse,
- Büyük abdest yapamama gibi barsak sendromları ortaya çıkarsa hiç vakit kaybetmeden hekime başvurulmalıdır.

1-5 Yaş Arası Çocuğunuz Topallıyor ise Bunun Nedeni Gribal Enfeksiyon Olabilir!  
Çocuğunuz yeni yeni yürümeye başladığı her adımı sizin için çok önemlidir. Ancak topallıyorsa ve vücudunda bir kırılganlık görüyorsanız çok dikkat edin. Çünkü düşme, çarpma gibi herhangi bir travma yaşamadığı halde topallıyorsa kalça eklemi toksik litihabi (geçici sinovit) geçiriyor olabilir.

**Hisar Intercontinental Hospital** Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü Uzmanı Prof. Dr. Teoman Benli ile özellikle yürüme çağındaki çocuklarda görülen ve ihmal edilmemesi gereken kalça eklemi toksik litihabını konuştuk...

Yürümeye yeni başlayan bir çocuğun çok fazla düşmesine rağmen; kemikleri daha elastik olduğu için kırıkların nadir görüldüğünü dile getiren Prof. Dr. Benli; "Burkulma tarzı rotasyonel kuvvetlerde yeni yürüten çocukta 'apalayan çocuk kırığı' (todler kırığı) görülebilir. Bu kırık kaval kemiğinde spiral tarzında çatlağa yol açarak tanıda güçlüğü neden olabilir. Eğer bir travma söz konusu değilse 1-5 yaş grubu çocuklarda en sık 'Geçici Sinovit' (Toksik Sinovit) denilen hastalık topallamaya yol açar. Çocuklarda grip gibi viral üst solunum yolu enfeksiyonları kalça eklemi tutar. Çocuk bir düşme veya travma geçirmemiştir. Ailesi de bir travma öyküsü vermez. Ancak araştırıldığında çocuğun son 3 hafta gibi yakın bir zamanda gribal enfeksiyon veya üst solunum yolu iltihabı geçirdiği tespit edilebilir. Topallama virüslerin toksinlerinin kalça eklemine sıvı artışı ile giden eklem içi dokuların tutulumu (sinovit) sonucu gelişir. Ateş ya yoktur veya hafiftir. Klinik muayenede kalçanın içe ve dışa döndürülmesi ağrılıdır. Radyoloji ve laboratuvar tetkikleri normaldir; kalçada eklem sıvısında ve lenfositlerde hafif artış görülür.

Tedavisi istirahat ve ağrı kesicilerdir. 1 hafta içinde hastalık kendi kendine geçer. Ancak yine de topallayan çocuk mutlaka bir ortopediste götürülmelidir. Çünkü gözden kaçan bir travma sonrası kırık ve çıkık topallamaya ve çocuğun yürürken ağlamasına yol açabilir. Ayrıca kalça eklemi bakterilerle olan; yüksek ateş, halsizlik eklemden kızarıklık gibi bulgularla oldukça gürültülü seyreden akut septik artriti de bu yaş grubunda sık görülür. Bunun dışında çocukluk çağı romatizmal eklem tutulumu (juvenil romatoid artritis) ve kemik tümörleri de bu yaş grubunda topallamaya yol açabilir. Bu nedenlerle 1-5 yaş arası çocuklarda topallama bulgusu asla ihmal edilmemelidir.' açıklamasında bulundu.