

Yayın Adı Akdeniz Güncel  
Referans No 21043554  
Renk Renkli

Yayın Tarihi 28.02.2013  
Etki Tarafsız  
STxCM 88,00

Küpür Sayfa 1  
Tiraj 1000  
Sayfa 2

# Çocuğunuz ağladığı için fitik olmaz!

## Kasık fitikleri özellikle yenidoğan döneminde çok daha fazla görülüyor.

Özellikle erkek çocuklarda daha fazla görülen ve ağladığı için ortaya çıktığına dair yanlış bir kanının olduğu kasık fitiklerini **Hisar Intercontinental Hospital Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Salih Somuncu** ile konuştuk...

Kasık fitiklerinin özellikle yenidoğan döneminde çok daha fazla görüldüğünü, bu nedenle ailelerin çok dikkatli olmaları gerektiğini belirten Doç. Dr. Salih Somuncu; Bebek anne karnındayken çocuğun testisi kendi karnındadır. Doğumuna yaklaşan dönemde 7. aydan itibaren kanala, oradan da torbaya iner. Bu iniş karın zarı da eşlik eder. İniş tamamlandıktan sonra torbaya inen kanal kapanır. Kapanan o zar tabakasının yanından arkasından, sperm kanalı, testisin atardamarı, toplardamarı ve sinir yapıları geçer. Eğer bu zar tabakası yetersiz kapanırsa karın içi organlar kanala doğru ilerler. Çocuklarda görülen bu kasık fitiğine indirekt kasık fitiği adı verilir. Özellikle **prematüre**, düşük doğum ağırlıklı, ailesinde **fitik** problemi, bağ doku hastalığı olanlarda ve inmemiş testis problemi yaşayan çocuklarda daha sık görülür. Doğumsal bir hastalıktır ve eninde

sonunda ortaya çıkar. En temel belirti kasıkta görülen şişliktir. Bu şişlik kabızlık, ağlama gibi karın içi basıncını artıran durumlarda ortaya çıkar. Bu nedenle aileler çocuklarının ağlama nedeniyle fitik olduğuna dair yanlış bir kanıya kapılabilirler. Aksine çocuklar ağladıkları için fitik olmazlar; fitik oldukları için ağlarlar.' diye konuştu...

**Kasık Fitiklerini Aynı Bölge Hastalıklarından Ayırt Edebilmeniz İçin...**  
Erkeklerde kasık



fitiklerinin dışında inmemiş testis, hidrosel ve kordon kisti de görülebilir. Eğer karın zarı tabakası, kanalın üstünde ve altında kapanır; ortası açık kalırsa kordon kisti adı verilen hastalık ortaya çıkar. Tedavisi kasık fitiklerinin tedavisi gibidir. Tanı konulduktan sonra bir süre beklenir; gerilemezse **cerrahi müdahale** yapılır. Halk arasında su fitiği olarak bilinen ve en çok yenidoğanlarda ilk 6 ayda görülen hidroselde ise;

zar tabakası kanal boyunca kapalıdır. Ama torbada testisin etrafı açıktır ve içi sıvı **dolar**. Genelde 1 yaşına kadar kontrol altında tutularak beklenir; çocuk 1 yaşını geçtikten sonra düzelmezse ameliyat edilir.

**Kasık Fitikleri Acele Cerrahi Müdahale Gerektirir ve İyi Bir Teknikle Onarılan Fitik Tekrarlamaz!**

Fitik acele cerrahi gerektiren bir problemdir. Kendiliğinden iyileşmesi söz konusu değildir.

Ameliyat; doktorun, hastanın ve ailenin hazır olduğu en kısa zamanda yapılmalıdır. Eğer ameliyat edilmez ise kısa vadede en korkulan **komplikasyon** fitiğin boğulmasıdır. Boğulan bu organlar fitik kesesinin içerisine ilerleyen bağırsak ve karın içi organlar olabileceği gibi; kızlarda çoğu zaman yumurtalık da **olabilir**. Bu nedenle erken müdahale çok önemlidir. Erkek çocuklarda uzun vadede fitik, testis ve damarlarına zarar vererek hücresel anlamda bozulmalara neden olur. Bu yüzden tanı konulduktan sonra en kısa sürede ameliyat gerekir. Genel anestezi altında yapılan operasyonun ardından hasta aynı gün taburcu edilir; ertesi gün ve 1 hafta sonra kontrole çağırılır.